

手术创伤增加,手术切口的总长度平均增加15 cm,从美观的角度上看,胸腔镜没有优势,“微创”的目的没有体现;即使对年老、心肺功能差的患者,能耐受4 h的单肺通气,一般都能耐受普通的开胸手术。

综上所述,电视胸腔镜辅助下的食管癌切除作为食管癌治疗的一种手段,不宜广泛开展,即使胸腔镜的操作非常熟练,小切口可以不用,腹部切口用腹腔镜代替,它依然存在着许多弊端,须严格掌握适应证。

作者简介:胡成广(1967—),男,山西省大同市人,学士学位,主治医师,主要从事食管癌、肺癌的诊治工作。

参考文献:

- [1] 刘桐林,王 俊,陈鸿义,等. 胸腔镜手术的临床应用[J]. 中华外科杂志,1994,32:180.
- [2] 王 俊,陈鸿义,孔同信,等. 胸部肿瘤的胸腔镜诊断治疗[J]. 中华心血管外科杂志,1995,11:156.
- [3] Boutin C, Viollat JR, Cargnino P *et al.* Thoracoscopy in Malignant Pleural Effusion[J]. Am Rev Respir Dis. 1981,12:588.

收稿日期:2002-12-16

癃闭舒胶囊治疗前列腺增生症50例临床观察

李秀荣,王 爽

(山西医科大学第二医院,山西 太原 030001)

前列腺增生症(BPH)是老年男性常见病,多发病,BPH的病因不清,治疗方法多种多样,一般对早期的患者采用药物治疗。癃闭舒是一种中成药,主要成分为补骨脂、益母草等,具有温肾化气、清热通淋、活血化瘀、散结止痛等功能。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组50例,年龄为60岁~79岁,病史1a~10a。所有患者均有不同程度的尿频、排尿困难症状,未经过手术等特殊治疗。患者在服药期间不得服用对主症起治疗作用的其他药物。

1.2 服药方法 口服癃闭舒胶囊每次3粒,每日2次,20d为一疗程,可长期服用。

1.3 疗效标准 服药0.5a后,观察患者的各类症状,服药期间注意观察不良反应,治疗前后做血、尿常规、肝肾功能检查。显效:临床症状消失,B超显示前列腺体积正常,残余尿量消失;有效:临床症状明显减轻,前列腺体积明显减小接近正常,残余尿量明显减少;无效:症状及前列腺体积无改变。

2 结 果 (见表I、表II)

由表I、表II可以看出经0.5a治疗后,患者各类症状均有显著改善。

服药期间所有患者未发生不良反应,且对患者的血、尿

常规和肝、肾功能没有影响。

3 讨 论

通过对50例BPH患者临床观察结果表明,癃闭舒不仅能够显著改善BPH患者的主观症状,提高其生活质量,而且对患者的最大尿流率也有较大的增加,并未发现有任何不良反应。患者对该药的耐受性良好。因此,该药是一种安全有效的药物。

表I 疗效观察

症 状	例 数	显 效	有 效	无 效
尿频	27	9	12	6
尿急	9	0	3	6
尿痛	36	15	15	6
小腹痛	21	9	12	0
前列腺体积增大	20	5	11	4
残余尿量	12	5	5	2

表II 总疗效观察

总例数	显 效	有 效	无 效
50	13	28	9

收稿日期:2002-12-30

作者简介:李秀荣(1975—),女,河北省行唐县人,主管护师,主要从事临床护理工作。

欢 迎 投 稿 欢 迎 订 阅 !